銀河中心領域の分子雲観測とMHD

鳥居 和史(野辺山宇宙電波観測所)

福井康雄, 榎谷玲依(名大)

町田真美(九大), 松元亮治(千葉大),

鈴木健(東大), 柿内健佑(名大/東大)

銀河系中心部

銀河系中心？

- $R_g \sim 0.001 \text{ pc} - 1 \text{ kpc}$
- Central Molecular Zone (CMZ) (Morris & Serabyn 1996)
 - 中心部300pcに $(2-6) \times 10^7 \text{ Mo}$
 - 銀河系の全分子ガスの10%
 - Dense gasの80% (Longmore+13)
 - 大速度分散(15–50km/s)
- しかし、星形成は不活発
 - 星形成率： $\sim 0.1 \text{ Mo/yr}$ (e.g., Barnes+17)
 - 一方で、活発な星形成領域 (Sgr B2)や2つの巨大星団 (Arches, Quintuplet)†

CMZの磁場構造

- 強い磁場 (※円盤部の典型的な分子雲で $1\mu\text{G}$)
 - 大局的に $> 50\mu\text{G}$ (Crocker + 10)
 - 局所的に ~ 1 mG (Yuzef-Zadeh+84; Morris 90; Ferriere 09)
- 磁場構造
 - 垂直磁場 (Yuzef-Zadeh+84; Morris 90; LaRosa+00)
 - 水平磁場 (Novak+00,03; Nishiyama+09,10)

銀河系中心部の分子雲

NANTEN 4m鏡CO(J=1-0)
(Torii et al. 2010b)

- 500km/sにおよぶ分子ガスの速度構造
- CMZの平行四辺形の速度構造
- CMZ外に点在するコンパクト(<50pc)な高速度(>100km/s)構造
- 高速度構造を結ぶように分布する定速度勾配の構造(銀画面に対して浮上している)

1. 銀河系中心部の磁気浮上ループと パーカー不安定性

パーカー不安定性による磁気浮上ループ

- 中心から700pcに、2本のループ状分子雲(ループ1, 2)を発見(Fukui+2006)
- 根元(フットポイント)でガスの集中と、大きな速度分散(~ 50 km/s)
- Parker不安定性による形成
 - フットポイントで衝撃波+ガスの集中
- 合計の運動エネルギー $\sim 10^{52}$ erg (Torii+2010b)
 - 超新星爆発100–1000個相当

ループ1、2フットポイントの高分解能観測

NANTEN2, Mopra, ASTEによるCO J=1-0, 3-2, 4-3, 7-6輝線の高分解能(~数pc)観測 (Torii et al. 2010a)

#複数のJ遷移を比較することで、分子雲の温度、密度を推定できる

- U字型の速度構造を発見
- CO3-2/1-0比が高く、全体で温度50K, 中央で>100K
- ガスの落下による加熱と、磁気リコネクションによる局所的な加速・加熱を提案
- U字型構造は分子雲ループで一般的(Kudo+2011)

ループ1、2フットポイントの高分解能観測

NANTEN2, Mopra, ASTEによるCO J=1-0, 3-2, 4-3, 7-6輝線の高分解能(~数pc)観測
(Torii et al. 2010a)

#複数のJ遷移を比較することで、分子雲の温度、密度を推定できる

- U字型の速度構造を発見
- CO3-2/1-0比が高く、全体で温度50K, 中央で>100K
- ガスの落下による加熱と、磁気リコネクションによる局所的な加速・加熱を提案
- U字型構造は分子雲ループで一般的(Kudo+2011)

銀河系中心部でのループ形成

- MHD数値計算の結果、銀河系中心で多数のループを検出
- Fujishita et al. (2009)により、ループ3の存在が報告

銀河系中心部でのループ形成

CMZの外側の分子雲

- コンパクト(<50pc)かつ大速度分散(>50km/s)の成分
- それらを結ぶ(またぐ)速度勾配を持った浮上成分

課題・疑問:

- 分子雲構造の理論的再現
- CMZへの適用

2. MHD円盤としてのCMZ

CMZの分子ガス (平行四辺形構造)

CMZの構成

1. Sgr A, Sgr B cloudsを含む主要部
(e.g., Sofue's Arms 1 & 2; Herschel ring)
2. p-v図で平行四辺形を取る成分
so-called “Expanding Molecular Ring”

CMZの分子ガス (平行四辺形構造)

so-called “Expanding Molecular Ring”

Galactic Bar起源説

- Binney et al. (1991)が提唱
- 楕円軌道のガス運動により非一様回転成分=平行四辺形を説明
- 銀河系中心業界の主流

数値計算例(Rodriguez-Fernandez & Combes 2008)

- 2MASSデータを元にポテンシャルを構築
- 数値計算により銀河系のアーム構造、CMZの平行四辺形の再現を試みる
- 大局的分布(アーム構造)は観測とよく一致
- CMZは...?
- 鉛直方向構造は取り扱っていない

数値計算例(Rodriguez-Fernandez & Combes 2008)

- 2MASSデータを元にポテンシャルを構築
- 数値計算により銀河系のアーム構造、CMZの平行四辺形の再現を試みる
- 大局的分布(アーム構造)は観測とよく一致
- CMZは...?
- 鉛直方向構造は取り扱っていない

MHD数値計算 (Suzuku et al. 2015)

- 銀河系中心広域MHD数値計算
- バー構造を含まない軸対象ポテンシャル (Miyamoto & Nagai 1975)
- 回転に伴った磁場の増幅, 乱流の励起 (差動回転, 磁気回転不安定性MRI, Parker不安定性)

MHD数值計算 (Suzuku et al. 2015)

- 時間依存性のある動径方向外向きの速度成分が励起
 - MRIに伴う角運動量輸送(遠心力の増減)と磁気圧勾配
- 位置-速度図で平行四辺形構造
- 非対象構造

MHD数值計算 (Suzuku et al. 2015)

Column Density ($|z| < 0.2 \text{ kpc}$, $n > 100 \text{ cm}^{-3}$) at $t=439.02 \text{ (Myr)}$

Column Density ($|z| < 0.2 \text{ kpc}$, $n > 100 \text{ cm}^{-3}$) at $t=441.61 \text{ (Myr)}$

- 時間依存性のある動径方向外向きの速度成分が励起
 - MRIに伴う角運動量輸送 (遠心力の増加) と磁気圧の上昇
- 位置-速度図で平行四辺形構造
- 非対象構造

MHD数値計算結果の解析

- Suzuki et al. (2015)で水平方向運動の解析
- 課題・疑問：
 - 鉛直方向の構造・運動の解析(Kakiuchi+ in prep.)
 - コンパクトな大速度分散構造は？

3. 赤外線二重らせん星雲(DHN)と磁気タワー

Double Helix Nebula in the CMZ

- Sgr A*の上方100pcに二重らせんの構造
- 距離: 8kpc (± 2 kpc) (Enokiya+14)

Double Helix Nebula (DHN)

- DHNに付随する分子雲を検出(Enokiya+14; Torii +14)
- 高さ100pcの分子雲の”柱”の先端にDHN
- 柱の根元はCircumnuclear disk方向に

磁気タワーモデル (Asahina+14)

- 超音速ジェット (図は $v_{\text{jet}} = 220 \text{ km/s}$) が HI gas layer に突入、熱的不安定性により低温・高密度ガスが形成 (Asahina+14).

課題・疑問:

- 分子雲柱の折れ曲がった構造
- DHN の二重らせん構造の作り方

4. まとめと展望

銀河系中心部とMHD

- これまでの観測・理論研究から、銀河系中心でMHD現象がガスの運動・形成に大きな影響を与えることが明らかに

大きな課題：星形成の理解

- 最近の理解
 - ガスの乱流がdense gasでの星形成を抑制 (Barnes+17)
 - 10–20Myrスケールのepisodicな星形成 (Kruijissen+14; Torrey+16)
 - 銀河バーによるガスのinflowが間欠的に星形成を促進 (Krumholz & Kruijissen 15)
- CMZのMHD的な取り扱いはまだ十分に浸透していない

CMZのパーカー不安定性

- パーカー不安定性はフットポイントにガスを集める作用 (Parker 66)
- フットポイントではガスの落下による衝撃波 (Matsumoto+88)

分子雲衝突による大質量星形成

- ・ 分子雲同士の衝突が大質量星形成をトリガー
 - 高い質量降着率で短時間($\sim 0.1\text{Myr}$)に形成
- ・ 2つの分子雲の大きな速度差(10–20km/s)が観測的特徴
- ・ 最近、観測的理解が大きく進展 (e.g., Torii+11,15,17; Fukui+14,16などいっぱい)

Habe & Ohta 1992

Super star clusters in the GC

巨大星団での分子雲衝突

Furukawa+09

Westerlund2

Fukui+14

NGC3603

Fukui+16

RCW38

Kuwahara in prep.

[DBS2003]179

- ・ 銀河系の既知の若い巨大星団は8例
- ・ うち星雲が付随する星団4例の全てで分子雲衝突の観測的証拠

cluster	Age [Myr]	LogM* [M _{sun}]	Size [pc]	分子雲
NGC3603	2.0	4.1	0.7	○
Westerlund2	2.0	4.2	0.8	○
[DBS2003]179	2-4	3.8	0.5	○
Westerlund1	3.5	4.0	1.0	×
Trumpler 14	2.0	4.5	0.5	--
Arches	2.0	4.3	0.4	×
Quintuplet	4.0	4.0	2.0	×
RCW38	<1.0	--	0.8	○

まとめ

- 銀河系中心部研究にMHDを取り入れることで、(課題は多くあるものの)様々な観測結果の解釈に成功(しつつある)
 - パーカー不安定性による磁気浮上ループ
 - MRIによるCMZ円盤動径方向のガスの運動($I-v$ 図での平行四辺形状のガス分布)
 - 磁気タワーが作る分子雲柱構造とDHN
- 銀河系中心領域の本質に迫っている確信
- 分子雲構造・星形成・X線ガンマ線(粒子加速)まで含めた統一的理解にむけて、松元先生、町田さん、今後ともよろしく願いします。