宇宙線を考慮した磁気流体シミュレーション

- 従来の数値解法 (Rice & Zank 1999, Case 2)
- 新たな数値解法
- 解析解

工藤 祐己
(鹿児島大学)
花輪 知幸
松元 亮治
(千葉大学)

宇宙線のエネルギー密度

$$E_{\text{cr}} = \frac{4\pi}{c} \int E^2 \frac{dN}{dE} d \ln E$$

$$\sim 1.4 \times 10^{-12} \text{ [erg cm}^{-3}\text{]}$$

星間ガスの熱エネルギー密度

$$E_g \sim 0.5 \times 10^{-12} \left[\frac{n}{0.3 \text{ [cm}^{-3}\text{]}} \right] \left[\frac{T}{8000 \text{ [K]}} \right] \text{ erg cm}^{-3}$$

磁気エネルギー密度

$$E_B = 1.0 \times 10^{-12} \left[\frac{B}{5 \text{ [\mu G]}} \right]^2 \text{ erg cm}^{-3}$$

$$E_{\text{cr}} \simeq E_{\text{mag}} \simeq E_g$$

宇宙線 = 陽子

エネルギースペクトル

Energies and rates of the cosmic-ray particles

0.3 (GeV)
 4.8×10^{-4} (erg)

単位面積・時間・立体角
 エネルギー

$\Delta E \sim 100 \text{ GeV}$ 運動エネルギー
 $\Delta \ln E \sim 6.9$

CR+(M)HD方程式の数値シミュレーション

宇宙線エネルギー式 (移流-拡散方程式)

$$\frac{\partial E_{cr}}{\partial t} + \nabla \cdot [(E_{cr} + P_{cr})\mathbf{v}] = \mathbf{v} \cdot \nabla P_{cr} + \nabla \cdot \left[\frac{\kappa_{\parallel} \mathbf{B} (\mathbf{B} \cdot \nabla E_{cr})}{|\mathbf{B}|^2} \right]$$

10⁻³
[pc]

10
[kpc]

10²
[Mpc]

Solar Wind
(HD, Fahr et al. 2000)

Fermi Bubble (Jet)
(MHD, Yang et al. 2012)

Galactic Dynamo & Wind
(MHD, e.g. Hanaz et al. 2013)

Large Scale Structure
(HD, Vazza et al. 2014)

Thermal energy CR energy

宇宙線エネルギー方程式

(Berezinskii 1990, Bykov et al. 2013)

$$\frac{\partial E_{\text{cr}}}{\partial t} + \nabla \cdot [(E_{\text{cr}} + P_{\text{cr}})\mathbf{v}] = \mathbf{v} \cdot \nabla P_{\text{cr}} + \nabla \cdot \left[\frac{\kappa_{\parallel} \mathbf{B} (\mathbf{B} \cdot \nabla E_{\text{cr}})}{|\mathbf{B}|^2} \right]$$

磁力線に沿った拡散近似 (波と粒子の相互作用)

宇宙線のジャイロ半径 ($v_{\text{cr}} \sim c$)

$$r_L \sim \frac{p_{\text{cr}} c}{eB} \sim 2.0 \times 10^{-7} \left[\frac{B}{5 [\mu\text{G}]} \right]^{-1} \left[\frac{p_{\text{cr}} c}{1 [\text{GeV}]} \right] [\text{pc}]$$

宇宙線の平均自由行程

$$\lambda_{\text{mfp}} \sim r_L \left(\frac{2\pi r_L}{l_{\text{max}}} \right)^{1-q} \left(\frac{B_0}{\delta B} \right)^2 \sim 0.13 \left[\frac{B_0}{5 [\mu\text{G}]} \right]^{-\frac{1}{3}} \left[\frac{l_{\text{max}}}{100 [\text{pc}]} \right]^{\frac{2}{3}} \left[\frac{p_{\text{cr}} c}{1 [\text{GeV}]} \right]^{\frac{1}{3}} [\text{pc}]$$

$$\frac{\delta B}{B_0} = O(1)$$

$$q = \frac{5}{3}$$

$$L \not\ll \lambda_{\text{mfp}} \quad \mathbf{v} \sim \langle \mathbf{v}_{\text{cr}} \rangle \ll c$$

流体近似

宇宙線は相対論的に運動するので

宇宙線の比熱比

$$E_{\text{cr}} = \langle E_{\text{kin}} \rangle n_{\text{cr}} \quad P_{\text{cr}} = \frac{\langle E_{\text{kin}} \rangle}{3} n_{\text{cr}} = (\gamma_{\text{cr}} - 1) E_{\text{cr}} \quad \longleftrightarrow \quad \gamma_{\text{cr}} = 4/3$$

Basic CR + Ideal MHD equations

(Berezinskii 1990, Bykov et al. 2013)

宇宙線エネルギー

$$\frac{\partial E_{\text{cr}}}{\partial t} + \nabla \cdot [(E_{\text{cr}} + P_{\text{cr}})\mathbf{v}] = \mathbf{v} \cdot \nabla P_{\text{cr}}$$

$$E_{\text{cr}} = \frac{P_{\text{cr}}}{\gamma_{\text{cr}} - 1}$$

仕事 磁力線に沿った拡散

運動量

$$\frac{\partial}{\partial t} (\rho \mathbf{v}) + \nabla \cdot \left[\rho \mathbf{v} \mathbf{v} + \left(P_{\text{g}} + P_{\text{cr}} + \frac{B^2}{2} \right) \mathbf{I} - \mathbf{B} \mathbf{B} \right] = 0$$

エネルギー

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{P_{\text{g}}}{\gamma_{\text{g}} - 1} + \frac{1}{2} \rho v^2 + \frac{B^2}{2} \right) + \nabla \cdot \left[\left(\frac{\gamma_{\text{g}}}{\gamma_{\text{g}} - 1} P_{\text{g}} + \frac{1}{2} \rho v^2 \right) \mathbf{v} + c \mathbf{E} \times \mathbf{B} \right] = -\mathbf{v} \cdot \nabla P_{\text{cr}}$$

質量

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot [\rho \mathbf{v}] = 0$$

磁束 (誘導方程式)

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = -c \nabla \times \mathbf{E} \quad \mathbf{E} = -\frac{\mathbf{v}}{c} \times \mathbf{B}$$

従来の数値解法の問題点

宇宙線エネルギー式は非保存形

保存形

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot [\rho \mathbf{v}] = 0$$

Center

Surface

- 標準的な数値解法を使える
- 保存則を満たし不連続面をとらえる

非保存形

$$\frac{\partial E_{\text{cr}}}{\partial t} + \nabla \cdot [(E_{\text{cr}} + P_{\text{cr}})\mathbf{v}] = \mathbf{v} \cdot \nabla P_{\text{cr}}$$

Center

Surface

ソース項

Mixed

Center : 離散化によって
物理量を定義
Surface : 数値計算手法による

非保存形の計算

Kuwabara et al. (2004) : CANS

Rasera & Chandran (2008) : Flash4

Dubois & Commerson (2015) : RAMSES π

Fully Conservation Form

(Kudoh Y., Hanawa T., 2016, MNRAS, 462, 4517)

CR エネルギー

$$\frac{\partial E_{\text{cr}}}{\partial t} + \nabla \cdot [(E_{\text{cr}} + P_{\text{cr}})\mathbf{v}] = \mathbf{v} \cdot \nabla P_{\text{cr}} \quad E_{\text{cr}} = \frac{P_{\text{cr}}}{\gamma_{\text{cr}} - 1}$$

CR 粒子数保存

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(P_{\text{cr}}^{1/\gamma_{\text{cr}}} \right) + \nabla \cdot \left[P_{\text{cr}}^{1/\gamma_{\text{cr}}} \mathbf{v} \right] = 0$$

$\propto$ CR 粒子数密度
(adiabatic : $K=1$)

$$\rho_{\text{cr}} \equiv P_{\text{cr}}^{1/\gamma_{\text{cr}}}$$

ポリトロープ関係

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{P_{\text{cr}}^{1/\gamma_{\text{cr}}}}{\rho} \right) = 0 \iff \frac{d}{dt} \left(\frac{P_{\text{cr}}}{\rho^{\gamma_{\text{cr}}}} \right) = 0 \iff P_{\text{cr}} = K \rho^{\gamma_{\text{cr}}}$$

CR Concentration

衝撃波において

ガスの運動エネルギーは熱エネルギーに変換(エントロピー増)

CRは断熱圧縮によって変化(Concentration = 一定)

1次元の宇宙線+流体系におけるリーマン問題の解

- Rankine-Hugoniot 関係 (ρ, v_x, P_g, P_{cr})

質量	$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} [\rho v_x] = 0$
運動量	$\frac{\partial}{\partial t} (\rho v_x) + \frac{\partial}{\partial x} [\rho v_x^2 + (P_g + P_{cr})] = 0$
エネルギー	$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{P_g}{\gamma_g - 1} + \frac{P_{cr}}{\gamma_{cr} - 1} + \frac{1}{2} \rho v_x^2 \right) + \frac{\partial}{\partial x} \left[\left(\frac{\gamma_g}{\gamma_g - 1} P_g + \frac{\gamma_{cr}}{\gamma_{cr} - 1} P_{cr} + \frac{1}{2} \rho v_x^2 \right) v_x \right] = 0$
宇宙線粒子数	$\frac{\partial}{\partial t} (P_{cr}^{1/\gamma_{cr}}) + \frac{\partial}{\partial x} [P_{cr}^{1/\gamma_{cr}} v_x] = 0$

- リーマン問題とリーマン解

初期状態 $U = \begin{cases} U_L & x < 0 \\ U_R & x \geq 0 \end{cases}$

宇宙線+流体系における1次元リーマン問題の解

Pfrommer et al. 2006

• 4つの波 (ρ, v_x, P_g, P_{cr})

- 音波モードで Concentration は一定, 修正音速 $c_s = \left(\frac{\gamma_g P_g + \gamma_{cr} P_{cr}}{\rho} \right)^{1/2}$
- 新たな波 (圧力平衡モード)
- CDとPBは縮退

1D CR+HD Shock Tube Problem

Dashed line : 初期状態, Solid line : 解析解

$\Delta x = 1/128$, @ $t=0.1$
Roe method, 2nd-order

	ρ	v_x	P_g	P_{cr}
left ($x < 0$)	1.0	0.0	2.0	1.0
right ($x \geq 0$)	0.2	0.0	0.02	0.1

CRエネルギー方程式の 保存形・非保存形解法の比較

$$\left. \begin{aligned}
 \text{vdP : } & \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{P_{\text{cr}}}{\gamma_{\text{cr}} - 1} \right) + \nabla \cdot \left[\frac{\gamma_{\text{cr}}}{\gamma_{\text{cr}} - 1} P_{\text{cr}} \mathbf{v} \right] = \mathbf{v} \cdot \nabla P_{\text{cr}} \\
 \text{Pdv : } & \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{P_{\text{cr}}}{\gamma_{\text{cr}} - 1} \right) + \nabla \cdot \left[\frac{P_{\text{cr}}}{\gamma_{\text{cr}} - 1} \mathbf{v} \right] = -P_{\text{cr}} \nabla \cdot \mathbf{v}
 \end{aligned} \right\} \text{Non- conservation}$$

$$\text{HLL \& Roe : } \quad \frac{\partial}{\partial t} \left(P_{\text{cr}}^{1/\gamma_{\text{cr}}} \right) + \nabla \cdot \left[P_{\text{cr}}^{1/\gamma_{\text{cr}}} \mathbf{v} \right] = 0 \quad \text{Conservation}$$

1D CR+MHD Shock Tube Problem

(Brio & Wu 1988 モデルの修正)

$\Delta x = 1/256, t = 0.08$

Roe method, 2nd order

	ρ	B_x	B_y	B_z	P_g	P_{cr}
Left ($x < 0$)	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.4
Right ($x \geq 0$)	0.125	1.0	-1.0	0.0	0.1	0.04

宇宙線を考慮した磁気流体シミュレーション

- 宇宙線 + 磁気流体方程式を保存形に変形

$$\text{CR “粒子数” 保存} \quad \rho_{\text{cr}} \equiv P_{\text{cr}}^{1/\gamma_{\text{cr}}}$$

- Rankine-Hugoniot 関係 (1次元 CR HD 方程式)

$$\text{Mass} \quad [\rho v] = 0$$

$$\text{Momentum} \quad [\rho v^2 + P_g + P_{\text{cr}}] = 0$$

$$\text{CR Number} \quad \left[P_{\text{cr}}^{1/\gamma_{\text{cr}}} v \right] = 0$$

$$\text{Energy} \quad \left[\frac{\gamma_g}{\gamma_g - 1} \frac{P_g}{\rho} + \frac{\gamma_{\text{cr}}}{\gamma_{\text{cr}} - 1} \frac{P_{\text{cr}}}{\rho} + \frac{1}{2} v^2 \right] = 0$$

$$\text{衝撃波で Concentration が連続} \quad \frac{P_{\text{cr}}^{1/\gamma_{\text{cr}}}}{\rho} = \text{const.}$$

- Roe法による、保存形方程式を解く数値計算コードを開発
非保存形のCRエネルギー方程式を用いると誤った解を導く
- 非等方拡散方程式の改良の必要性
Flux Limited Diffusion, ゼロ磁場回避、(Super-Time Stepping法)
- 簡単なモデルほど数値計算がなされていない。